




Rozdział 5. Po porodzie

Uwaga (dotyczy wszystkich kart obserwacji):

Wszystkie znaki w kolorze czarnym na kartach obserwacji naniósł właścicielki kart, natomiast kolorem czerwonym przedstawiono interpretację oraz uwagi.

Karmi dziecko piersią na żądanie.
 Po ustąpieniu odchodów połogowych obserwowała suchość.
 Zaczęła zapisywać obserwacje, gdy pojawiło się krwawienie.



Zosia
 lat 26

Nr cyklu

1


Długość fazy niższej temp.

○

Długość cyklu

○

Jeśli małżonkowie z ważnych przyczyn (HV10) nie planują poczęcia dziecka, to zaleca się współżyć nie częściej niż co drugi dzień wieczorem, gdy jest sucho (powrócił okres nieplodności).



Zosia
 lat 26


1 c.d.

Długość fazy
 niższej temp.

○

Długość cyklu

71



Zosia

Nr cyklu

2

Długość fazy niższej temp.

32

Długość cyklu


39

Miejsce

P

Godzina

6.00



Edyta

Nr cyklu


2

Długość fazy
 niższej temp.

17

Długość cyklu

38




Mila
 l. 25

Nr cyklu
 1


Długość fazy
 niższej temp.
 32

Długość cyklu
 43

Wskazana konsultacja z lekarzem ginekologiem.



Należy zapytać, co się wydarzyło w dniach 37, 38, 39 cyklu? W tych dniach nie uznajemy skoku temperatury, bowiem w dniach poprzedzających nie było żadnego rozwoju śluzu. Ten cykl jest prawdopodobnie jednofazowy.



Uwaga: ze względów technicznych wykres skrócony, od 8 do 16 dnia cyklu zaobserwowano sucho, bez pomiaru temperatury.

zobacz: Ćwiczenia str. 48 „Okres niepłodności przed jajczkowaniem” punkt B) 4 lub 5.

